



Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky

Ostrava
13.10.2003

15

Činnost oboru dermatovenerologie v roce 2002

Podkladem pro zpracování dat o ambulantní péči v oboru dermatovenerologie byl výkaz A (MZ) 1-01, který vyplňuje každé oddělení (pracoviště) oboru. Výkaz byl součástí Programu statistických zjišťování v ČR na rok 2002 (Sbírka zákonů ČR, částka 148 ze dne 13.11.2001, formou vyhlášky ČSÚ č. 393/2001 Sb. a její samostatné přílohy). Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Návratnost výkazů byla 98,7 %.

Ambulantní péči zabezpečovalo k 31.12.2002 na 76 odděleních a pracovištích dermatovenerologie Moravskoslezského kraje celkem 71,44 lékařů a 82,83 SZP (v přepočteném počtu, dále jen v PP), včetně smluvních pracovníků.

V roce 2002 bylo v kraji provedeno 604 520 ošetření - vyšetření (dále jen ošetření) celkem, v přepočtu na 10 000 obyvatel 4 781,28 ošetření. Nejvíce ošetření bylo provedeno v okrese Ostrava 226 505 celkem, přepočet na 10 000 obyvatel činil 7 179,26 ošetření. Na jednoho pacienta připadlo v průměru za kraj 2,3 ošetření, nejvíce okres Karviná 2,9, nejméně okres Ostrava 2,1 ošetření. Přepočet na 1 lékaře (v PP) činil 8 462 ošetření, nejvíce okres Frýdek - Místek 10 318, nejméně okres Ostrava 7 792.


Ve sledovaném roce bylo v kraji léčeno 262 812 pacientů celkem, průměr na 10 000 obyvatel činil 2 078,64 pacientů. Nejvíce osob se léčilo v okrese Ostrava 106 650, čímž se podílel 40,6 % na celkovém počtu léčených pacientů v kraji, nejméně v okrese Bruntál 45 369 (17,3 %). Také v přepočtu na 10 000 obyvatel připadl největší počet pacientů na okres Ostrava, a to 3 388,83, nejméně v okrese Karviná 1 425,63 pacientů.

Z celkového počtu 262 812 léčených osob bylo v kraji léčeno 28 444 (10,83 %) pro atopickou dermatitidu (L20.-), 16 085 (6,12 %) pro psoriázu (L40.-), 4 334 (1,65 %) pro parazitní onemocnění (B85-89, z toho 87,72 % pro svrab B86), 1 173 (0,45 %) pro erysipelas (A46).


Nejčastější příčinou dispenzarizace u obou pohlaví byla diagnóza Ca basocelulare (C44), kterou onemocnělo 2 066 žen a 1 882 mužů. Dalšími nejčastějšími důvody dispenzarizace žen bylo onemocnění Ca spinocelulare (C44), které se vyskytlo ve 479 případech a dále maligní melanom kůže (C43), který byl diagnostikován u 471 žen. U mužů následovaly ve 513 případech STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, A63, A64) a 496 mužů bylo dispenzarizováno pro kožní nemoci z povolání (B35-49, L23, L24, L25). Jediný nově hlášený případ dispenzarizace pro HIV pozitivní / AIDS (B20-24) v roce 2002 byl zaznamenán u osoby mužského pohlaví v okrese Nový Jičín.

V roce 2002 se na dermatovenerologických odděleních Moravskoslezského kraje pracovalo celkem se 156 přístroji, z toho 90 (57,7 %) jich bylo starší 8 let. Nejvíce bylo zpravidajskými jednotkami vykázáno mikroskopů, a to 80 (51,3 %). V průměru je používalo každé oddělení. Následovaly přístroje pro celkovou fototerapii 37 (23,7 %), kryokautery 27 (17,3 %), vysokovýkonné lasery 8 (5,1 %), přístroje pro vyšetření cév ultrazvukem 3 (1,9 %) a také se na území kraje používá 1 pletysmograf (0,6 %). Nejvíce provedených výkonů připadlo v průměru na jeden vysokovýkonný laser, a to 2 042,4.


**Na 1 lékaře (v PP) oboru dermatovenerologie připadlo
v roce 2002**




**Počet ošetření (vyšetření) v oboru dermatovenerologie
v roce 2002 - na 10 000 obyvatel**



**Léčení pacienti v oboru dermatovenerologie
pro vybraná onemocnění**




Dispenzarizovaní pacienti v oboru dermatovenerologie pro vybraná onemocnění - ženy



- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| I. Kožní nemoci z povolání | VI. Ca basocelulare |
| II. Syphilis | VII. Ca spinocelulare |
| III. Gonorrhoea | VIII. Maligní melanom kůže |
| IV. STD - sexuálně přenosné nemoci | IX. Maligní lymfom kůže |
| V. Pozitivní HIV / AIDS | X. Novotvary in situ |

Dispenzarizovaní pacienti v oboru dermatovenerologie pro vybraná onemocnění - muži



Personální zabezpečení v oboru dermatovenerologie k 31.12.2002

Území	Přepočtený počet		
	lékaři		SZP
	absolutně	na 10 000 obyvatel	
Bruntál	4,55	0,43	4,00
Frydek - Místek	8,19	0,36	9,44
Karviná	14,35	0,52	14,83
Nový Jičín	8,08	0,51	8,01
Opava	7,20	0,40	11,25
Ostrava	29,07	0,92	35,30
Moravskoslezský kraj	71,44	0,57	82,83

Činnost oboru dermatovenerologie v roce 2002

Území	Počet léčených pacientů			Počet ošetření - vyšetření			
	celkem	na 10 000 obyvatel	na 1 lékaře (v PP)	celkem	na 10 000 obyvatel	na 1 pacienta	na 1 lékaře (v PP)
Bruntál	19 190	1 832,91	4 218	45 369	4 333,36	2,4	9 971
Frydek - Místek	37 036	1 634,46	4 522	84 506	3 729,39	2,3	10 318
Karviná	39 599	1 425,63	2 760	113 922	4 101,38	2,9	7 939
Nový Jičín	32 484	2 035,54	4 020	72 112	4 518,75	2,2	8 925
Opava	27 853	1 538,87	3 868	62 106	3 431,35	2,2	8 626
Ostrava	106 650	3 388,83	3 669	226 505	7 197,26	2,1	7 792
Moravskoslezský kraj	262 812	2 078,64	3 679	604 520	4 781,28	2,3	8 462

Počet léčených osob pro vybranou diagnózu

Území	Parazitární onemocnění (B85-89)			Erysipelas (A46)		Psoriáza (L40.-)		Atopická dermatitida (L20.-)	
	celkem	na 10 000 obyvatel	z toho scabies (B86)	celkem	na 10 000 obyvatel	celkem	na 10 000 obyvatel	celkem	na 10 000 obyvatel
BR	429	40,98	284	27	2,58	1 169	111,66	1 794	171,35
FM	727	32,08	711	80	3,53	4 342	191,62	6 896	304,33
KA	858	30,89	803	139	5,00	2 310	83,16	3 851	138,64
NJ	273	17,11	208	102	6,39	1 007	63,10	2 434	152,52
OP	523	28,90	481	227	12,54	2 480	137,02	3 814	210,72
OV	1 524	48,43	1 315	598	19,00	4 777	151,79	9 655	306,79
MSK kraj	4 334	34,28	3 802	1 173	9,28	16 085	127,22	28 444	224,97

Dispenzarizovaní pacienti v roce 2002 - ženy

Vybrané diagnózy (MKN - 10)	BR	FM	KA	NJ	OP	OV	MSK kraj
	absolutně						
Kožní nemoci z povolání (B35 - 49, L23, L24, L25)	2	68	47	29	14	12	172
Syphilis (A50 - A53)	11	64	73	15	20	117	300
Gonorrhoea (A54)	-	3	1	2	5	17	28
STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, A63, A64)	3	2	32	3	15	119	174
HIV pozitivní / AIDS (B20 - B24)	-	-	-	-	-	-	-
Novotvary in situ (D00 - D09)	4	16	1	2	4	47	74
Ca basocelulare (C44)	118	601	473	172	122	580	2 066
Ca spinocelulare (C44)	34	49	79	14	7	296	479
Maligní melanom kůže (C43)	14	57	47	11	2	340	471
Maligní lymfom kůže (C84-85)	-	-	1	1	1	3	6
	na 10 000 žen						
Kožní nemoci z povolání (B35 - 49, L23, L24, L25)	0,38	5,88	3,33	3,56	1,51	0,74	2,66
Syphilis (A50 - A53)	2,07	5,53	5,17	1,84	2,16	7,18	4,64
Gonorrhoea (A54)	-	0,26	0,07	0,25	0,54	1,04	0,43
STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, A63, A64)	0,56	0,17	2,26	0,37	1,62	7,31	2,69
HIV pozitivní / AIDS (B20 - B24)	-	-	-	-	-	-	-
Novotvary in situ (D00 - D09)	0,75	1,38	0,07	0,25	0,43	2,89	1,14
Ca basocelulare (C44)	22,21	51,95	33,47	21,14	13,16	35,61	31,93
Ca spinocelulare (C44)	6,40	4,24	5,59	1,72	0,76	18,17	7,40
Maligní melanom kůže (C43)	2,64	4,93	3,33	1,35	0,22	20,87	7,28
Maligní lymfom kůže (C84-85)	-	-	0,07	0,12	0,11	0,18	0,09

Dispenzarizovaní pacienti v roce 2002 - muži

Vybrané diagnózy (MKN - 10)	BR	FM	KA	NJ	OP	OV	MSK kraj
	absolutně						
Kožní nemoci z povolání (B35 - 49, L23, L24, L25)	2	138	207	49	13	87	496
Syphilis (A50 - A53)	9	67	63	11	11	143	304
Gonorrhoea (A54)	-	4	5	5	10	44	68
STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, A63, A64)	18	7	109	13	34	332	513
HIV pozitivní / AIDS (B20 - B24)	-	-	-	1	-	-	1
Novotvary in situ (D00 - D09)	5	17	1	2	3	57	85
Ca basocelulare (C44)	89	498	467	144	92	592	1 882
Ca spinocelulare (C44)	24	64	67	16	5	280	456
Maligní melanom kůže (C43)	16	54	28	11	2	292	403
Maligní lymfom kůže (C84-85)	-	2	6	5	1	5	19
	na 10 000 mužů						
Kožní nemoci z povolání (B35 - 49, L23, L24, L25)	0,39	12,44	15,17	6,26	1,47	5,73	8,04
Syphilis (A50 - A53)	1,75	6,04	4,62	1,41	1,25	9,42	4,92
Gonorrhoea (A54)	-	0,36	0,37	0,64	1,13	2,90	1,10
STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, A63, A64)	3,49	0,63	7,99	1,66	3,85	21,87	8,31
HIV pozitivní / AIDS (B20 - B24)	-	-	-	0,13	-	-	0,02
Novotvary in situ (D00 - D09)	0,97	1,53	0,07	0,26	0,34	3,75	1,38
Ca basocelulare (C44)	17,26	44,90	34,22	18,41	10,42	39,00	30,49
Ca spinocelulare (C44)	4,65	5,77	4,91	2,05	0,57	18,44	7,39
Maligní melanom kůže (C43)	3,10	4,87	2,05	1,41	0,23	19,23	6,53
Maligní lymfom kůže (C84-85)	-	0,18	0,44	0,64	0,11	0,33	0,31

Vypracoval: kolektiv Moravskoslezského krajského odboru ÚZIS ČR v Ostravě