



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Onkologický report ČR


Karty diagnóz

Dokument je vytvořen v rámci projektu
„Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace
k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015811


Epidemiologie zhoubných novotvarů bez nemelanomového kožního zhoubného novotvaru (C00–C97 bez C44)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} celkem



Trendy prevalence¹ celkem



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 osob za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)




Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.


Epidemiologie zhoubných novotvarů bez nemelanomového kožního zhoubného novotvaru (C00–C97 bez C44)




Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} dle pohlaví



Trendy prevalence¹ dle pohlaví



Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie


Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 osob	Celkem: 563,1 M: 613,2 / Ž: 514,5	Počet na 100 000 osob	Celkem: 259,0 M: 291,4 / Ž: 227,6
Průměrný počet ročně	Celkem: 59 854 M: 32 084 / Ž: 27 770	Průměrný počet ročně	Celkem: 27 536 M: 15 248 / Ž: 12 287
Věk pacientů Medián (25–75% kvantil) Podíl osob do 60 let	Muži: 69 (62–75) let 20,4 % Ženy: 68 (58–76) let 27,7 %	Prevalence ¹ (k 31. 12. 2020)	
Poměr muži : ženy	1,2 : 1	Počet na 100 000 osob	Celkem: 4 275 M: 3 883 / Ž: 4 657
		Absolutní počet	Celkem: 457 455 M: 204 789 / Ž: 252 666

Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad


Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku (C18–C20)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} dle pohlaví




Trendy prevalence¹ dle pohlaví



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 osob za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku (C18–C20)




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientů



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie


Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 osob	Celkem: 68,5 M: 83,1 / Ž: 54,4	Počet na 100 000 osob	Celkem: 31,8 M: 38,6 / Ž: 25,3
Průměrný počet ročně	Celkem: 7 283 M: 4 348 / Ž: 2 935	Průměrný počet ročně	Celkem: 3 386 M: 2 022 / Ž: 1 364
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 13,6 % Ženy: 10,6 %	Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 13,3 % Ženy: 11,1 %
Věk pacientů	Muži: 70 (62–76) let	Prevalence ¹ (k 31. 12. 2020)	
Medián (25–75% kvantil)	18,4 %	Počet na 100 000 osob	Celkem: 561,6 M: 638,0 / Ž: 487,2
Podíl osob do 60 let	Ženy: 72 (63–79) let 17,9 %	Absolutní počet	Celkem: 60 088 M: 33 651 / Ž: 26 437
Poměr muži : ženy	1,5 : 1		

Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad


Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plic (C33, C34)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} dle pohlaví




Trendy prevalence¹ dle pohlaví



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 osob za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plic (C33, C34)




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientů



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)




Souhrn epidemiologie

Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 osob	Celkem: 62,4 M: 81,4 / Ž: 43,9	Počet na 100 000 osob	Celkem: 50,3 M: 67,1 / Ž: 33,9
Průměrný počet ročně	Celkem: 6 631 M: 4 259 / Ž: 2 372	Průměrný počet ročně	Celkem: 5 342 M: 3 513 / Ž: 1 829
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 13,3 % Ženy: 8,5 %	Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 23,0 % Ženy: 14,9 %
Věk pacientů	Muži: 70 (64–75) let	Prevalence ¹ (k 31. 12. 2020)	
Medián (25–75% kvantil)	11,5 % Ženy: 70 (64–76) let	Počet na 100 000 osob	Celkem: 127,4 M: 147,7 / Ž: 107,7
Podíl osob do 60 let	12,9 %	Absolutní počet	Celkem: 13 632 M: 7 789 / Ž: 5 843
Poměr muži : ženy	1,9 : 1		


Epidemiologie zhoubného novotvaru prsu (C50) u žen



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} u žen




Trendy prevalence¹ u žen



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 žen za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru prsu (C50) u žen




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných patientek



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk patientek (roční průměr za období 2016–2020)




Souhrn epidemiologie

Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 žen	135,4	Počet na 100 000 žen	31,0
Průměrný počet ročně	7 310	Průměrný počet ročně	1 675
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Ženy: 26,3 %	Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Ženy: 13,6 %
Věk patientek Medián (25–75% kvantil) Podíl osob do 60 let	65 (53–73) let 35,7 %	Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)	
		Počet na 100 000 žen	1 716,4
		Absolutní počet	93 132


Epidemiologie zhoubného novotvaru hrdla děložního (C53)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} u žen



Trendy prevalence¹ u žen



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 žen za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru hrdla děložního (C53)





Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientek



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientek (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 žen	14,6
Průměrný počet ročně	786
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Ženy: 2,8 %
Věk pacientek Medián (25–75% kvantil) Podíl osob do 60 let	54 (42–67) let 59,0 %

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 žen	5,6
Průměrný počet ročně	304
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Ženy: 2,5 %


Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 žen	326,8
Absolutní počet	17 730


Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} u mužů




Trendy prevalence¹ u mužů



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 mužů za období 2016–2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61)




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientů



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)




Souhrn epidemiologie

Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 mužů	146,1	Počet na 100 000 mužů	27,3
Průměrný počet ročně	7 647	Průměrný počet ročně	1 426
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 23,8 %	Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 9,4 %
Věk pacientů		Prevalence ¹ (k 31. 12. 2020)	
Medián (25–75% kvantil)	69 (64–74) let	Počet na 100 000 mužů	1 357,4
Podíl osob do 60 let	12,5 %	Absolutní počet	71 592


Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny (C64)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} dle pohlaví




Trendy prevalence¹ dle pohlaví



Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání

INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)




POMĚR MORTALITA²/INCIDENCE

(hodnoceno podle počtu na 100 000 osob za období 2016–2020)





PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)



Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny (C64)




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientů



* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie


Incidence ¹ (roční průměr za 2016–2020)		Mortalita ² (roční průměr za 2016–2020)	
Počet na 100 000 osob	Celkem: 29,4 M: 38,4 / Ž: 20,6	Počet na 100 000 osob	Celkem: 9,2 M: 11,9 / Ž: 6,5
Průměrný počet ročně	Celkem: 3 120 M: 2 010 / Ž: 1 110	Průměrný počet ročně	Celkem: 977 M: 625 / Ž: 353
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 6,3 % Ženy: 4,0 %	Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 4,1 % Ženy: 2,9 %
Věk pacientů	67 (59–73) let	Prevalence ¹ (k 31. 12. 2020)	
Medián (25–75% kvantil)	26,2 %	Počet na 100 000 osob	Celkem: 268,1 M: 337,6 / Ž: 200,7
Podíl osob do 60 let	70 (62–76) let 18,8 %	Absolutní počet	Celkem: 28 692 M: 17 803 / Ž: 10 889
Poměr muži : ženy	1,9 : 1		

Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad


Epidemiologie zhoubného novotvaru slinivky břišní (C25)



Trendy incidence¹ a mortality^{1,2} celkem




Trendy prevalence¹ celkem



Zdroj dat: ¹Národní onkologický registr, ²Český statistický úřad

Incidence, mortalita a prevalence v regionálním srovnání


INCIDENCE (roční průměr za období 2016–2020)




MORTALITA² (roční průměr za období 2016–2020)



PĚTILETÁ PREVALENCE* (k 31. 12. 2020)



PREVALENCE** (k 31. 12. 2020)





*Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným v posledních pěti letech.

**Lidé naživu k 31. 12. 2020 s daným nádorem diagnostikovaným kdykoliv v minulosti.

Epidemiologie zhoubného novotvaru slinivky břišní (C25)




Podíl a výskyt klinických stadií u nově diagnostikovaných pacientů




* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)

Věkově specifická incidence



Věková struktura



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 22,6 M: 23,6 / Ž: 21,6
Průměrný počet ročně	Celkem: 2 401 M: 1 234 / Ž: 1 167
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 3,8 % Ženy: 4,2 %
Věk pacientů	69 (63–75) let
Medián (25–75% kvantil)	17,1 % Ženy: 12,2 %
Podíl osob do 60 let	12,2 %
Poměr muži : ženy	1,1 : 1

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 20,5 M: 21,1 / Ž: 20,0
Průměrný počet ročně	Celkem: 2 183 M: 1 102 / Ž: 1 081
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	Muži: 7,2 % Ženy: 8,8 %


Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 30,1 M: 29,9 / Ž: 30,2
Absolutní počet	Celkem: 3 216 M: 1 576 / Ž: 1 640


Epidemiologie Hodgkinova lymfomu (HL)




Trendy incidence¹ celkem



Trendy prevalence¹ celkem



Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 2,8 M: 3,1 / Ž: 2,5
Průměrný počet ročně	Celkem: 294 M: 161 / Ž: 133
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 6,0 % Ženy: 5,7 %
Věk pacientů	Muži: 46 (32–63) let
Medián (25–75% kvantil)	68,9 %
Podíl osob do 60 let	Ženy: 43 (29–66) let 65,5 %
Poměr muži : ženy	1,3 : 1

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 0,5 M: 0,6 / Ž: 0,4
Průměrný počet ročně	Celkem: 54 M: 31 / Ž: 23
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 2,5 % Ženy: 2,2 %


Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 60,3 M: 61,8 / Ž: 58,9
Absolutní počet	Celkem: 6 455 M: 3 258 / Ž: 3 197


Epidemiologie Non-Hodgkinova lymfomu (NHL)




Trendy incidence¹ celkem



Trendy prevalence¹ celkem



Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 16,3 M: 17,3 / Ž: 15,4
Průměrný počet ročně	Celkem: 1 737 M: 905 / Ž: 832
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 33,8 % Ženy: 35,8 %
Věk pacientů	Muži: 68 (58–75) let
Medián (25–75% kvantil)	28,5 % Ženy: 69 (60–76) let
Podíl osob do 60 let	23,6 %
Poměr muži : ženy	1,1 : 1

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 5,4 M: 5,9 / Ž: 4,8
Průměrný počet ročně	Celkem: 571 M: 311 / Ž: 260
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 25,1 % Ženy: 24,7 %


Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 139,7 M: 138,6 / Ž: 140,8
Absolutní počet	Celkem: 14 952 M: 7 310 / Ž: 7 642


Epidemiologie mnohočetného myelomu a plasmocytárních novotvarů (MM)




Trendy incidence¹ celkem



Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Trendy prevalence¹ celkem



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 6,0 M: 6,4 / Ž: 5,5
Průměrný počet ročně	Celkem: 634 M: 335 / Ž: 299
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 12,5 % Ženy: 12,9 %
Věk pacientů	Muži: 69 (62–75) let
Medián (25–75% kvantil)	18,6 % Ženy: 71 (64–77) let
Podíl osob do 60 let	16,7 %
Poměr muži : ženy	1,2 : 1

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 3,8 M: 3,9 / Ž: 3,6
Průměrný počet ročně	Celkem: 400 M: 206 / Ž: 194
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 16,6 % Ženy: 18,4 %


Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 29,3 M: 30,5 / Ž: 28,0
Absolutní počet	Celkem: 3 131 M: 1 611 / Ž: 1 520


Epidemiologie akutní leukémie (ALL a AML)




Trendy incidence¹ celkem



Trendy prevalence¹ celkem



Věk pacientů (roční průměr za období 2016–2020)



Souhrn epidemiologie

Incidence¹ (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 4,8 M: 5,1 / Ž: 4,4
Průměrný počet ročně	Celkem: 506 M: 268 / Ž: 238
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 10,1 % Ženy: 10,2 %
Věk pacientů	Muži: 63 (39–73) let
Medián (25–75% kvantil)	44,7 % Ženy: 44,7 %
Podíl osob do 60 let	66 (45–75) let 37,6 %
Poměr muži : ženy	1,2 : 1

Mortalita² (roční průměr za 2016–2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 3,2 M: 3,3 / Ž: 3,1
Průměrný počet ročně	Celkem: 336 M: 171 / Ž: 165
Podíl z novotvarů mízní a krevetvorné tkáně	Muži: 13,9 % Ženy: 15,6 %

Prevalence¹ (k 31. 12. 2020)

Počet na 100 000 osob	Celkem: 32,1 M: 34,6 / Ž: 29,7
Absolutní počet	Celkem: 3 434 M: 1 824 / Ž: 1 610